



- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة
- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة
- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة

٢٠١٨ © كلية طب وجiene

fold

جلطة وريدية عميقة (DVT)

ما زلت يعني ذلك

جلطة وريدية عميقة (DVT), وهي جلطة دموية توجد غالباً في القدم أو الذراع، والتي يمكن ان تؤدي الى نقص تدفق الدم للأطراف بسبب ضربة الشفط الداخلي، أو فيما (غيره) وتصلح هذه يمكن للجلطة أن تصيب كلتا، وتنقل إلى القولتين بسبب اتساعها ونوعها مما يؤثر على التنفس ووظيفة القلب، أو تصل إلى المخ و يؤدي إلى السكتة الدماغية والوفاة، إذا تعرضت إلى إصابة بالنخاع الشوكي (SCI)، فإن مخاطرة تعرضك لجلطة دموية تبدأ بعد 72 ساعة بعد الإصابة الأولية وتستمر طوال حياتك. معظم الأشخاص يتطور لديهم الجلطة الدموية بعد SCI، وإنما غالباً فإن تصف هؤلاء الذين تم علاجهم من الجلطات الدموية سوف تنشأ لديهم جلطات أخرى.

نخاع وردي عميقه حالة تستدعي التدخل الطبي العاجل، انتظر مقدم الرعاية الصحية في الحال

من المهم ان تتبع الأوصيانيات الفحوصات المخبرية في الوقت المحدد لتقدير حالة الدم

- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة
- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة
- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة

- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة
- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة
- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة

DVT جلاطة دموية عميقة

- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة
- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة
- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة

DVT جلاطة دموية عميقة

- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة
- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة
- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة

DVT جلاطة دموية عميقة

- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة
- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة
- PE جلاطة دموية
- D-dimer
- CRN-LPDD
- DVT جلاطة دموية عميقة

DVT جلاطة دموية عميقة

الجلطة

DVT جلاطة دموية عميقة

معلومات

الاسم:

ضغط الدم الأساسي:

درجة حرارة الجسم الأساسية:

موقع الإصابة العصبية:

مقدم الرعاية الصحية الأساسية:

رقم التليفون:

الاتصال عند الطوارئ:

في حالة الاتصال عند الطوارئ:

العلاقة:

رقم التليفون:

مذكرة المرضي والجهاز العصبي المركزي (MRI) PR3000، والمذكرة من الإدارة الأمريكية للصحة

البلمرة التي أرجعتها المذكرة المتميزة من الأدوية والمواد الكيميائية، والتي يعودون

أو الإزالة لا ينبع بالضرورة من إدارة الرعاية الصحية الأساسية للخدمة الجراحية.

أسباب شائعة

- مرض حاد يستدعي الإقامة بالمستشفى / استيقاف مطول
- الجلوس لمدة طويلة على غير عادتك دون القراءة على التمدد خاصية لمدة 4 ساعات
- صدمة
- صدمة خارجية في مكان ما على القدمين أو الذراعين، خاصة على خلف الركبة، أو الخد أو الكوع أو تحت الإبط
- الملابس الضيقة مثل ارتباط الساق الضاغطة، أو الجوارب أو الجوارب المجددة أو الملقمة، أو السراويل المحتشدة أو القمصان
- بعض الاضطرابات القلبية مثل عدم انتظام ضربات القلب
- الميل نحو زيادة تثثر الدم
- التقدم في العمر
- وسائل منع الحمل الفمية، والعلاجات الهرمونية البديلة
- الجراحة
- وجود جلطة دموية سابقة يوجد مخاطرة أعلى لحدوث آخر
- الاستعداد الوراثي

كما ينبغي، اخطر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتاريخ مرضك الصحي فيما يخص الجلطة الوريدية:

- لدى شلل أو إصابة بالنخاع الشوكي والتي تجعلي في مخاطرة عالية للتعرض للجلطة الوريدية
- لدى جلطة وريدية سابقة أو لدى تاريخ عالي سابق للجلطة الوريدية.
- أنتول محففات الدم لمنع الجلطة الوريدية أو توقف مؤخراً عن تناول محففات الدم للجلطة الوريدية.