



www.spinalcordrecovery.org
 फ़ोन: (443) 923-9215
 फ़ैक्स: (443) 923-9230
 707 North Broadway
 Baltimore, MD 21205

Research, Restoration, Recovery

International Center for Spinal Cord Injury
 at Kennedy Krieger Institute



महत्त्वपूर्ण: यदि आप उपचार में आते हैं तो निम्नलिखित चीजें भी जाननी चाहिए।
 आपकी डिम्बवैलिंग कैथेटर से सक्ता है।
 आपका रक्तदाब नीचा नहीं गिरना चाहिए।
 और समाधान के कारणों का निर्धारण करने की जरूरत है।

- रक्तदाब का निरीक्षण करना: रक्तदाब को नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आप अपने रक्तदाब को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- शरीर का तापमान: शरीर का तापमान 100.4°F (38°C) से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपका तापमान अधिक है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।
- शरीर का वजन: शरीर का वजन नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आपका वजन बढ़ रहा है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।
- शरीर की गति: शरीर की गति को नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आपकी गति कम हो रही है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।
- शरीर की तापमान: शरीर का तापमान 100.4°F (38°C) से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपका तापमान अधिक है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।
- शरीर का वजन: शरीर का वजन नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आपका वजन बढ़ रहा है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।
- शरीर की गति: शरीर की गति को नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आपकी गति कम हो रही है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।
- शरीर की तापमान: शरीर का तापमान 100.4°F (38°C) से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपका तापमान अधिक है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।

www.paralysis.org
 फ़ोन: (800) 539-7309
 फ़ैक्स: (973) 912-9433
 636 Morris Turnpike
 Suite 3A
 Short Hills, NJ 07078

CHRISTOPHER & DANA REEVE FOUNDATION
 PARALYSIS RESOURCE CENTER



- आंतों की जांच करें—रक्तदाब को नियंत्रित रखें। आंतों की जांच करने से रक्तदाब को नियंत्रित रखना आसान होता है।
- रक्तदाब का निरीक्षण करना: रक्तदाब को नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आप अपने रक्तदाब को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- शरीर का तापमान: शरीर का तापमान 100.4°F (38°C) से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपका तापमान अधिक है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।
- शरीर का वजन: शरीर का वजन नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आपका वजन बढ़ रहा है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।
- शरीर की गति: शरीर की गति को नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आपकी गति कम हो रही है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।
- शरीर की तापमान: शरीर का तापमान 100.4°F (38°C) से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपका तापमान अधिक है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।
- शरीर का वजन: शरीर का वजन नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आपका वजन बढ़ रहा है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।
- शरीर की गति: शरीर की गति को नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आपकी गति कम हो रही है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।
- शरीर की तापमान: शरीर का तापमान 100.4°F (38°C) से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपका तापमान अधिक है, तो आपको यह सूचित करना चाहिए।

- पीलापन
- शरीर ठंडा होना
- निचुराए और ठंड लगाना और पसीना आना
- जिता बुझा रहना और ठंड लगाना
- उलटी करनी पड़ना
- घटने से बचने के लिए सावधान रहना

चोट के स्तर से नीचे

- उच्च रक्तदाब (रक्तदाब में तीव्र वृद्धि, बच्चे को 15 mm Hg प्रकुंचक (सिस्टोलिक) सामान्य से 20 mm Hg अधिक और डिस्टोलिक सामान्य से 10 mm Hg अधिक)
- रक्तदाब में तीव्र वृद्धि (रक्तदाब में तीव्र वृद्धि, बच्चे को 15 mm Hg प्रकुंचक (सिस्टोलिक) सामान्य से 20 mm Hg अधिक और डिस्टोलिक सामान्य से 10 mm Hg अधिक)
- रक्तदाब में तीव्र वृद्धि (रक्तदाब में तीव्र वृद्धि, बच्चे को 15 mm Hg प्रकुंचक (सिस्टोलिक) सामान्य से 20 mm Hg अधिक और डिस्टोलिक सामान्य से 10 mm Hg अधिक)
- रक्तदाब में तीव्र वृद्धि (रक्तदाब में तीव्र वृद्धि, बच्चे को 15 mm Hg प्रकुंचक (सिस्टोलिक) सामान्य से 20 mm Hg अधिक और डिस्टोलिक सामान्य से 10 mm Hg अधिक)

चोट के स्तर के ऊपर

सामान्य संकेत और लक्षण

fold

कृपया करें

मेरी जानकारी

नाम: _____

चिकित्सा इतिहास

वेसलाइन रक्तदाब: _____

वेसलाइन तापमान: _____

चोट की तंत्रिकीय स्थिति: _____

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता: _____

फ़ोन नंबर: _____

एलजी: _____

आपातकालीन संपर्क

आपात स्थिति में कृपया संपर्क करें: _____

रिश्ता: _____

फ़ोन नंबर: _____

विकिर्त्सक ध्यान दें

ऑटोनॉमिक डिसेफ्लेक्सिया (एडी) से पीड़ित बच्चों के लिए निम्नलिखित उपचार सलाह हैं।

- रोगी को सीधी बैठी हुई स्थिति में रखें (90 डिग्री)
- हर 2-3 मिनट पर बोधी की निगरानी करें।
- शीघ्रता से की जाने वाली जांचों में विस्तारित मूत्राशय/आंतों के लिए पेट की जांच और चोट के स्तर से नीचे किसी अन्य अंग प्रणाली की जांच शामिल है जो डिसेफ्लेक्सिया का कारण हो सकती है।
- यदि पेशाब के लिए इंड्वैलिंग कैथेटर नहीं लगाया गया है, तो व्यक्ति को कैथेटर लगाएं। यदि इंड्वैलिंग कैथेटर लगाया गया है, तो रूकावट, सिलवटी, संकुचनी या बाधाओं के लिए सिस्टम की जांच करें।
- यदि प्रकुंचक (सिस्टोलिक) रक्तदाब: 5 वर्ष की आयु से कम के बच्चों में 120 से अधिक है 6-12 वर्ष की आयु के बच्चों में 130 से अधिक है किशोरों में 140 से अधिक है एडी के कारणों की छानबीन किए जाने के दौरान, तत्काल और छोटी अवधि में प्रभाव करने वाली उच्च रक्तदाब रोधी दवा दें।
- निट्रो पेस्ट—1/2" (13 वर्ष से कम) या 1" (13 वर्ष के बराबर या इससे अधिक), स्थानिक रूप से चोट के स्तर के ऊपर हर 30 मिनट में लगाएं, जब बोधी स्थिर हो जाता है, तो वाइप ऑफ करें, यथावश्यक रूप से फिर से लगाएं।
- निफेडिपाइन (यदि निट्रो पेस्ट उपलब्ध नहीं है)—0.25-0.5 मि.ग्रा./किलोग्राम प्रति खुराक (13 वर्ष से कम) या 10 मि.ग्रा. प्रति खुराक (13 वर्ष के बराबर या इससे अधिक), तत्काल निर्माचन (रिलीज) स्वरूप ज़ीम के नीचे या रोगी को चबाने के लिए कहें, यथावश्यक रूप से हर 20-30 मिनट में दें।
- IV उच्चरक्तदाब रोधी—केवल निगरानी की जानी वाली व्यवस्था में (आई.सी.यू.)
- एडी घटना के समाधान के बाद लक्षणों और रक्तदाब की निगरानी कम से कम 2 घंटों के लिए करें।
- एडी से दौरे, मस्तिष्काघात, या मौत हो सकती है।

यह परियोजना यू एस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कम्युनिटी सोसियल रिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, वाशिंगटन डी.सी. 20204 की ओर से चोट रक्तदाब (आर्सेनाल) द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित है। सरकारों प्रायोजकता के अंतर्गत परियोजनाओं पर कार्य करने वाले अनुदान प्राप्तियों को अपने निष्कर्षों और परिणामों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए, दृष्टि विचार या राय नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कम्युनिटी सोसियल रिपार्टमेंट के आधिकारिक विचार या राय नहीं हैं।

बाल संस्करण

ऑटोनॉमिक डिसेफ्लेक्सिया (एडी)

यह क्या होता है:

रक्त दाब इस बात की माप है कि रक्त कितनी अच्छी तरह से हृदय से शरीर के शेष भागों में जाता है। ऑटोनॉमिक डिसेफ्लेक्सिया (एडी) ऐसे लोगों के रक्तदाब को प्रभावित करता है जिनको शोरासिक 16 स्तर से ऊपर रीड की हड्डी में चोट लगी होती है। उनका शरीर उस समय भ्रमिंत हो जाता है जब कोई हानिकारक या पीड़ादायक चीज उनको क्षति पहुंचा रही होती है वे यह नहीं बता पाते कि क्या है। इससे उनके शरीर में घबराहट पैदा होती है और उनका रक्त दाब बढ़ जाता है। उनके रक्त दाब का बहुत अधिक बढ़ना असुरक्षित होता है। यह पहचान करना महत्वपूर्ण होता है कि उन्हें किससे पीडा या हानि हो रही है और उसे दूर किया जाए। इसे ठीक न करना खतरनाक हो सकता है और व्यक्ति बहुत बीमार हो सकता है।

ऑटोनॉमिक डिसेफ्लेक्सिया एक विकिर्त्सीय आपातस्थिति है!

सामान्य कारण:

- मूत्राशय पूरा भरा होना
- आंतों पूरी तरह से भरी हुई/कब्ज
- जख्म
- टूटी हुई हड्डियां
- त्यचा का जलना
- संक्रमण
- पैर की अंगुली का अंतर्बंधन (अंगुलबेड़ा)
- कोई भी ऐसी स्थिति या प्रक्रियाएं जिनसे पीडा या असुविधा हो सकती है लेकिन यह तंत्रिकीय चोट स्तर से नीचे स्थित है।