



636 Morris Turnpike, Suite 3A | Short Hills, NJ 07078
 전화: (800) 539-7309 | www.painphys.org




- 다리나 팔, 특히 오금, 사타구니, 팔꿈치 또는 겨드랑이에 가해지는 외부 압력
- 조이는 의류 (예: 고무 레깅스 밴드, 주름밴드 스타킹이나 양말, 꼭 끼는 바지나 셔츠)
- 부정맥 등의 심장 질환
- 혈전을 증가시키는 소인
- 노화
- 경구 피임약, 호르몬 대체 요법
- 수술
- 혈전이 일단 생기면 새 혈전이 생길 위험이 높아집니다.
- 유전적 소인

DVT 예방 방법

- 물 마시기
- 걷기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기

DVT 예방 방법



- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기

- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기



- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기

DVT 예방 방법

- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기
- 다리 펴기

DVT 예방 방법

fold

원인

- 입원/장기간 움직임 수 없는 심각한 질병
- 기증에서 벗어난 장시간의 앉은 자세로, 특히 4시간 이상 뻗거나 펼 수 없는 상태
- 외상
- 다리나 팔, 특히 오금, 사타구니, 팔꿈치 또는 겨드랑이에 가해지는 외부 압력
- 조이는 의류 (예: 고무 레깅스 밴드, 주름밴드 스타킹이나 양말, 꼭 끼는 바지나 셔츠)
- 부정맥 등의 심장 질환
- 혈전을 증가시키는 소인
- 노화
- 경구 피임약, 호르몬 대체 요법
- 수술
- 혈전이 일단 생기면 새 혈전이 생길 위험이 높아집니다.
- 유전적 소인

다음과 같은 본인의 증요한 심부정맥 혈전증(DVT) 병력을 의사에게 알립니다.

- 나는 마비 또는 척수 손상으로 인해 DVT 발생 가능성이 높다.
- 이전에 DVT를 앓았다. 나는 DVT 가족력이 있다.
- 나는 DVT 예방을 위해 혈액희석제를 복용하고 있다. DVT 예방을 위한 혈액희석제 복용을 최근 중단했다.

내 정보

이름: _____

병력

기준치 혈압: _____

기준치 체온: _____

신경 손상 부위: _____

1차 의료기관: _____

전화번호: _____

알레르기 질환: _____

긴급 연락처

긴급상황 시 연락: _____

관계: _____

전화번호: _____

이 프로젝트는 워싱턴 D.C. 20201에 소재한 Department of Health and Human Services(미국 보건 복지부) 산하 Administration for Community Living(공동체 생활 관리국)의 보조금 번호 90PR3101로부터 일부 지원을 받고 있습니다. 정부 지원을 받아 프로젝트를 진행하는 피수여자는 발견한 내용과 결론을 자유롭게 발표할 수 있습니다. 따라서 관점이나 의견이 Administration for Community Living(공동체 생활 관리국)의 공식 정책을 대변하지 않을 수 있습니다.

심부정맥 혈전증 (DVT)



심부정맥 혈전증이란

심부정맥 혈전증(DVT)이란 다리나 팔에서 가장 자주 발견되는 혈액 응고로서, 말단으로 가는 혈류가 부족하게 되어 체내 조직의 손상, 부종(부어오름), 피부 괴사를 일으킵니다. 혈전이 이동하여 폐로 가면 폐색전(PE)을 일으켜 호흡과 심장 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 또 혈전이 뇌로 가면 뇌졸중이나 사망에 이를 수 있습니다. 척수 손상(SCI)을 입은 경우, 혈전이 생길 위험성은 최초 손상 72시간 후부터 시작되어 평생 이어집니다. 대부분의 환자는 SCI 이후 혈전이 발생합니다. 혈전 치료를 받은 환자 중 거의 반수에서 다시 혈전이 생깁니다.

심부정맥 혈전증은 응급의료 상황입니다. 즉시 병원을 방문하십시오.

때를 놓치지 말고 지시에 따라 임상검사를 받아서 혈액 상태를 확인해야 합니다.

