



www.spinalcordrecovery.org
 Fax: (443) 923-9215
 Telephone: (443) 923-9230
 Baltimore, MD 21205
 707 North Broadway

International Center for Spinal Cord Injury
 at Kennedy Krieger Institute
 Research, Restoration, Recovery.



- Suriin ang balat**—Tingnan kung may mga bagong sugat, pressure ulcer, pasa, paso, bukol, hiwa, kagal ng insekto, atbp. ang iyong balat.
 - Tingnan kung may iba pang sanhi**—Kung hindi mawawala ang mga sintomas, tingnan kung may iba pang nakakapinsala sa iyo.
 - Humingi ng tulong**—Kung hindi mo agarang matulungan ang mga sintomas nang mag-isa, tumawag sa tanggapan ng iyong doktor upang makatanggap ng katatagan ng tulong o punumita sa pinakamalapit na emergency room.
- MAHALAGA:** Kung pupunta ka sa ospital, sabihin sa mga doktor at nurse na maaring kailanganin dysreflexia at maaring kailanganin mong ipasuri ang presyon ng iyong dugo, manatiling nakapungo nang dugo, manatiling nakapungo nang dugo, at malaman ang mga sanhi ng problema.

www.paralysis.org
 Fax: (973) 912-9433
 Telephone: (800) 539-7309
 Short Hills, NJ 07078
 3A
 636 Morris Turnpike Suite

CHRISTOPHER & DANA REEVE FOUNDATION
 PARALYSIS RESOURCE CENTER



- Umpo nang direkso**—Umpo nang direkso o taas ang iyong ulo nang 90 degrees.
- Tanggapin ang damit o anumang suot**—Tanggapin o luwagan ang damit o anumang suot na masikip o mahigpit.
- Kunin ang presyon ng dugo**—Kunin ang presyon ng iyong dugo kada 5 minuto kung mas mataas pa rin ito kaysa sa karaniwang 15 mm Hg na mas mataas kaysa sa karaniwang presyon sa mga bata, at 15-20 mm Hg na mas mataas sa karaniwang presyon sa mga teenager). Tiyaking gagamit ka ng cuff para sa presyon ng dugo na naaangkop ang laki.
- Suriin ang pantog**—Umihit (ibig sabihin, layan ng catheter ang iyong pantog). Kung mayroon kang catheter sa katawan, tingnan kung mayroon itong tupi o buhol.
- Suriin ang dumit**—Suriin ang iyong dumit pagkatapos mong gumamit ng pamamahitid na jelly o ointment.

- Mataas na Presyon ng Dugo (*Mabitis na pagtaas ng presyon ng dugo, na 15 mm Hg sa mga bata, at 15-20 mm karamihan sa mga mataas kaysa sa karamihan sa mga teenager*)
 - Bradycardia (*mabagal na pagtibok ng puso*) o tachycardia (*mabilis na pagtibok ng puso*)
 - Maitinding pananatili ng ulo
 - Pagkaragdagan ng nervos/pangamba/kakot
 - Pamumula ng mga pisngi/leeg/balikbat
 - Panalabo ng panginig
 - Pagbabara ng ilong
 - Pagpapawis
 - Panatili ng balahibo
 - Pakiramdam na parang tinusok
- SA ITAAS NG ANTAS NG PINSALA**
- Pananatili ng tiyan, pakiramdam na parang nasusuka
 - Panginig ng nang walang lagnat
 - Panatili ng pagpapawis
 - Pamumula

fold

ANG DAPAT GAWIN

MGA KARANIWANG SENYALES AT SINTOMAS

PAUNAWA PARA SA DOKTOR

Ang sumusunod ay mga rekomendasyon sa pangagamot para sa mga batang may *Autonomic Dysreflexia (AD)*

- Paupuin nang direkso ang pasyente (hanggang sa 90 degrees).
- Kunin ang BP kada 2-3 minuto.
- Suriin kaagad ang kanyang tiyan upang malaman kung namamaga ang kanyang pantog/bituka at iba pang organ system sa ibaba ng antas ng pinsala (level of injury), na maaaring nagiging sanhi ng dysreflexia.
- Kung wala siyang urinary catheter sa katawan, layan ng catheter ang indibidwal. Kung mayroon siyang catheter sa katawan, tingnan kung may mga buhol, tupi, makipot na bahagi o bara ang system nito.
- Kung ang systolic BP ay:
 - >120 sa mga batang wala pang edad na 5 taon
 - >130 sa mga batang may edad na 6-12 taon
 - >140 sa mga teenager
 magbigay ng isang antihypertensive na mabilis tumalab at nawawala kaagad ang epekto habang inaalam ang sanhi ng AD.
- **Nitro Paste**—1/2" (<13y) o 1" (>13y), ipahid sa itaas ng antas ng pinsala kada 30 minuto at punasan kapag naging normal na ang BP, muling ipahid kung kinakailangan.
- **Nifedipine** (kung WALANG magagamit na Nitro paste)—0.25-0.5mg/kg kada dosis (<13y) o 10mg kada dosis (>13y), ilagay at ipasipsip ang tabletang mabilis tumalab sa ilalim ng dila o hilingin sa pasyenteng ngayin ito, maaaring muling ibigay kada 20-30 minuto kung kinakailangan.
- **Mga IV Antihypertensive**—sa sinusubaybayan ng lugar lang (I.C.U.)
- Subaybayan ang mga sintomas at BP sa loob nang hindi bababa sa 2 oras pagkatapos malugunan ang pagsumpung ng AD.
- Ang AD ay maaaring humantong sa mga kumbulsyon, stroke o pagkamatay!

AKING IMPORMASYON

Pangalan: _____

MEDIKAL NA KASAYSAYAN

Baseline na Presyon ng Dugo: _____

Baseline na Temperatura ng Katawan: _____

Neurological na Lokasyon ng Pinsala: _____

Provider ng Pangunahing Pangangalagang Pangkalusugan: _____

Número ng Telepono: _____

Mga Allergy: _____

CONTACT KAPAG MAY EMERGENCY

Kung Sakaling Magkaroon ng Emergency, Tumawag Kay: _____

Kaugnayan: _____

Número ng Telepono: _____

Ang proyektong ito ay sinuportahan ng U.S. Administration for Community Living, Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 20201, bilang bahagi ng grant number 90PR3001. Hinihikayat ang mga grantee na nagasagawa ng mga proyekto sa tulong ng sponsorship ng pamahalaan na ipahayag ang kanilang mga naging-alaman at naging konklusyon. Samakatawid, ang kanilang mga pananaw o opinyon ay hindi sinusasalamin sa opisyal na patakaran ng Administration for Community Living.

Pambatang Edisyon

AUTONOMIC DYSREFLEXIA (AD)



ANO ITO:

Ang presyon ng dugo ay ang suklat ng pagdaloy ng dugo mula sa puso patungo sa iba pang mga bahagi ng katawan. Ang Autonomic Dysreflexia (AD) ay nakakaapekto sa presyon ng dugo ng mga taong may pinsala sa spinal cord sa itaas ng thoracic T6 level. Naililito ang kanilang katawan kapag may mapaminsalang bagay na nakakaapekto sa kanila at hindi nila matukoy kung ano iyon. Dahil dito, naaalerto ang kanilang katawan at tumataas ang presyon ng kanilang dugo. Hindi ligtas kung labis na tataas ang presyon ng kanilang dugo. Mahalagang malaman kung ano ang nakakapinsala sa kanila at alisin ito. Kapag hindi ito natugunan, maaari itong maging mapanganib at magdulot ng malalang sakit sa taong iyon.

Ang Autonomic Dysreflexia ay isang Medical na Emergency!

MGA KARANIWANG SANHI:

- Problema sa pag-ih
- Problema sa pagdumi/pagtitibi
- Mga sugat
- Mga may baling buto
- Mga paso
- Mga impeksyon
- Mga ingrown sa paa
- Anumang kundisyon o mga pamamaraang maaaring magdulot ng pananatili o masamang pakiramdam, ngunit nasa ibaba ng neurologic na antas ng pinsala.

